

课程总结

熊明

mingshone@163.com

South China Normal University

- 传统逻辑时期 (350s BC-1879 AD)
 - 亚里士多德 (350s BC): 三段论理论, 推理有效性概念
 - 斯多葛学派 (320s BC): 命题逻辑的一部分
 - 莱布尼茨 (1700s): 普遍语言, 推理即计算
 - 布尔 (1847): 布尔代数, 命题逻辑的代数化

- 传统逻辑时期 (350s BC-1879 AD)
 - 亚里士多德 (350s BC): 三段论理论, 推理有效性概念
 - 斯多葛学派 (320s BC): 命题逻辑的一部分
 - 莱布尼茨 (1700s): 普遍语言, 推理即计算
 - 布尔 (1847): 布尔代数, 命题逻辑的代数化

- 传统逻辑时期 (350s BC-1879 AD)
 - 亚里士多德 (350s BC): 三段论理论, 推理有效性概念
 - 斯多葛学派 (320s BC): 命题逻辑的一部分
 - 莱布尼茨 (1700s): 普遍语言, 推理即计算
 - 布尔 (1847): 布尔代数, 命题逻辑的代数化

- 传统逻辑时期 (350s BC-1879 AD)
 - 亚里士多德 (350s BC): 三段论理论, 推理有效性概念
 - 斯多葛学派 (320s BC): 命题逻辑的一部分
 - 莱布尼茨 (1700s): 普遍语言, 推理即计算
 - 布尔 (1847): 布尔代数, 命题逻辑的代数化

- 传统逻辑时期 (350s BC-1879 AD)
 - 亚里士多德 (350s BC): 三段论理论, 推理有效性概念
 - 斯多葛学派 (320s BC): 命题逻辑的一部分
 - 莱布尼茨 (1700s): 普遍语言, 推理即计算
 - 布尔 (1847): 布尔代数, 命题逻辑的代数化

逻辑大事记

- 现代逻辑时期 (1879-至今)
 - 弗雷格 (1879): 量化逻辑 (含一阶逻辑及高阶逻辑)
 - 希尔伯特 23 个问题中的逻辑问题 (1900):
 - NO 01: 连续统假设问题
 - NO 02: 算术公理相容性的有穷证明
 - NO 10: 丢番图方程可解性的判别
 - 希尔伯特 (1928): 一阶逻辑的完全性问题和有效性判定问题
 - 哥德尔 (1929): 一阶逻辑的完全性定理 (对完全性问题的肯定性回答)
 - 哥德尔 (1931): 不完全性定理 (对希尔伯特第二问题的否定性回答)
 - 丘齐与图灵 (1936): λ 演算、图灵机、一阶逻辑的不可判定性定理 (对判定问题的否定性回答)
 - 哥德尔 (1938): 连续统假设的一致性定理 (对希尔伯特第一问题的部分回答)
 - 柯恩 (1965): 连续统假设的独立性定理 (对希尔伯特第一问题的完全回答)

逻辑大事记

- 现代逻辑时期 (1879-至今)
 - **弗雷格** (1879): 量化逻辑 (含**一阶逻辑**及高阶逻辑)
 - 希尔伯特 23 个问题中的逻辑问题 (1900):
 - NO 01: 连续统假设问题
 - NO 02: 算术公理相容性的有穷证明
 - NO 10: 丢番图方程可解性的判别
 - **希尔伯特** (1928): 一阶逻辑的完全性问题和**有效性判定问题**
 - 哥德尔 (1929): 一阶逻辑的完全性定理 (对完全性问题的肯定性回答)
 - 哥德尔 (1931): 不完全性定理 (对希尔伯特第二问题的否定性回答)
 - **丘齐与图灵** (1936): λ 演算、**图灵机**、**一阶逻辑的不可判定性定理 (对判定问题的否定性回答)**
 - 哥德尔 (1938): 连续统假设的一致性定理 (对希尔伯特第一问题的部分回答)
 - 柯恩 (1965): 连续统假设的独立性定理 (对**希尔伯特第一问题的否定回答**)

逻辑大事记

- 现代逻辑时期 (1879-至今)
 - 弗雷格 (1879): 量化逻辑 (含一阶逻辑及高阶逻辑)
 - 希尔伯特 23 个问题中的逻辑问题 (1900):
 - NO 01: 连续统假设问题
 - NO 02: 算术公理相容性的有穷证明
 - NO 10: 丢番图方程可解性的判别
 - 希尔伯特 (1928): 一阶逻辑的完全性问题和有效性判定问题
 - 哥德尔 (1929): 一阶逻辑的完全性定理 (对完全性问题的肯定性回答)
 - 哥德尔 (1931): 不完全性定理 (对希尔伯特第二问题的否定性回答)
 - 丘齐与图灵 (1936): λ 演算、图灵机、一阶逻辑的不可判定性定理 (对判定问题的否定性回答)
 - 哥德尔 (1938): 连续统假设的一致性定理 (对希尔伯特第一问题的部分回答)
 - 柯恩 (1965): 连续统假设的独立性定理 (对希尔伯特第一问题的完全回答)

逻辑大事记

- 现代逻辑时期（1879-至今）
 - **弗雷格**（1879）：量化逻辑（含**一阶逻辑**及高阶逻辑）
 - 希尔伯特 23 个问题中的逻辑问题（1900）：
 - NO 01: 连续统假设问题
 - NO 02: 算术公理相容性的有穷证明
 - NO 10: 丢番图方程可解性的判别
 - **希尔伯特**（1928）：一阶逻辑的完全性问题和**有效性判定问题**
 - 哥德尔（1929）：一阶逻辑的完全性定理（对完全性问题的肯定性回答）
 - 哥德尔（1931）：不完全性定理（对希尔伯特第二问题的否定性回答）
 - **丘齐与图灵**（1936）： λ 演算、**图灵机**、**一阶逻辑的不可判定性定理（对判定问题的否定性回答）**
 - 哥德尔（1938）：连续统假设的一致性定理（对希尔伯特第一问题的部分回答）
 - 柯恩（1965）：连续统假设的独立性定理（对希尔伯特第一问题的否定性回答）

在计算机的发展史上，我们还不应该遗忘：

- 巴贝奇与阿达（英国诗人拜伦之女）（1823）：分析机

逻辑与计算机的时间轴



推理 = 计算

课程复习指南

- 命题逻辑
 - 命题及其形式
 - 公式与真值表
 - 重言式的判定（真值表、解析树）
 - 推理有效性的判定
- 一阶逻辑
 - 命题及其形式
 - 公式及其代入
 - 有效式的判定（解析树、反模型）
- 图灵机初步
 - 图灵机
 - 停机问题与判定问题
 - 不完全性定理

课程复习指南

- 命题逻辑
 - 命题及其形式
 - 公式与真值表
 - 重言式的判定（真值表、解析树）
 - 推理有效性的判定
- 一阶逻辑
 - 命题及其形式
 - 公式及其代入
 - 有效式的判定（解析树、反模型）
- 图灵机初步
 - 图灵机
 - 停机问题与判定问题
 - 不完备性定理

考试题型（不一定全部出现）

- 判断题
- 填空题
- 问答题
- 分析题
- 证明题
- 应用题
- 综合题

判断题

判断下列说法是否正确（正确打√，错误打×，无需写出过程）。

(1) 重言式的否定一定是矛盾式。 ()

问答题

按要求分析下列命题的形式。

- (1) 用命题逻辑的语言写出命题“如果明天天晴 (p), 那么我们就去打网球 (q), 否则, 我们去图书馆 (r).”的形式。

分析题

分析下列推理是否有效，要求扼要地陈述理由：

- 如果那些奸商保有一点良知并且知道问题的严重性，那么毒奶粉事件就根本不会发生，那些奸商当然知道问题的严重性但毒奶粉事件还是发生了，所以，那些奸商已经完全丧失了良知。判断这一推理是否有效。

证明题

- 用解析树证明 $\forall v W(v) \rightarrow W(c)$ 是有效式。

期末考试安排

- 考试时间：11月10日（周四）19:00-21:00
- 考试地点：南404
- 考试形式：开卷（只允许使用纸质文档，禁止使用包括电脑、平板、电子书、手机、智能手表等等在内的一切电子设备，禁止在考场交换材料）
- 考场事宜：出示学生证或身份证，不能出示证件的学生不得参加考试；隔位就坐，服从安排！

预祝同学们取得好成绩!